3 Απριλίου 2006 15:10

Η μακροχρόνια χρήση κινητού και ασύρματου τηλεφώνου μπορεί να κρύβει κινδύνους

Νέο επεισόδιο στο σίριαλ της ασφάλειας της μακροχρόνιας χρήσης κινητών και ασύρματων τηλεφώνων γράφει μία νέα μελέτη, η οποία έδειξε ότι ενδέχεται να αυξάνουν τον κίνδυνο ανάπτυξης όγκων στον εγκέφαλο.

Πέρυσι, το Ολλανδικό Συμβούλιο Υγείας (DHC) σε μια ανασκόπηση των μελετών που έχουν διεξαχθεί επί του θέματος σε όλο τον κόσμο, δεν διαπίστωσε ένδειξη βλάβης στην υγεία από την ακτινοβολία που εκπέμπεται από τα κινητά τηλέφωνα – ούτε από τις κεραίες.

Μία βρετανική μελέτη, που διήρκησε τέσσερα χρόνια και δημοσιοποιήθηκε εφέτος τον Ιανουάριο, επίσης κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δεν υπάρχει σχέση μεταξύ της συστηματικής, μακροχρόνιας χρήσης του κινητού τηλεφώνου και του ακουστικού νευρινώματος (η πιο κοινή μορφή όγκου του εγκεφάλου).

Ωστόσο, ερευνητές από το Εθνικό Ινστιτούτο για την Εργασιακή Ζωή (NIWL), στη Σουηδία, εξέτασαν τη χρήση κινητών και ασύρματων τηλεφώνων που έκαναν 2.200 ασθενείς με καρκίνο και αντίστοιχος αριθμός υγιών εθελοντών (ομάδα ελέγχου).

Από τους ασθενείς με καρκίνο, ηλικίας 20 έως 80 ετών, οι 905 είχαν κακοήθη όγκο στον εγκέφαλο και σχεδόν το 10% από αυτούς ήσαν φανατικοί χρήστες κινητών τηλεφώνων.

«Από τους 905 ασθενείς, οι 85 ήταν οι λεγόμενοι “φανατικοί χρήστες του κινητού”, δηλαδή είχαν αρχίσει νωρίς να χρησιμοποιούν κινητό ή/και ασύρματο τηλέφωνο και το χρησιμοποιούσαν πολύ», αναφέρουν οι συντάκτες της μελέτης σε ανακοίνωσή τους που εκδόθηκε από το Ινστιτούτο.

Η μελέτη, που δημοσιεύεται στα «Διεθνή Αρχεία Εργασιακής και Περιβαλλοντικής Υγείας», ορίζει τη «μεγάλη χρήση κινητού» ως τουλάχιστον 2.000 ώρες - χρονικό διάστημα που «αντιστοιχεί σε δεκαετή χρήση στον εργασιακό χώρο για μια ώρα κάθε ημέρα».

Ορίζει επίσης ως «πρώιμη χρήση κινητού» αυτήν που αρχίζει πριν από την ηλικία των 20 ετών.

Σύμφωνα με τη μελέτη, διαπιστώθηκε αξιοσημείωτη αύξηση του κινδύνου αναπτύξεως όγκου στην πλευρά της κεφαλής όπου το τηλέφωνο γενικά χρησιμοποιείται.

Όπως δήλωσε στο Ρόιτερες ο επικεφαλής ερευνητής δρ Κγιέλ Μίλντ, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Όρεμπρο, σύμφωνα με τα στοιχεία της μελέτης οι φανατικοί χρήστες των κινητών διατρέχουν διπλάσιες πιθανότητες αναπτύξεως κακοήθους όγκου από την πλευρά του κεφαλιού που χρησιμοποιούν το τηλέφωνό τους.

«Το κλειδί για να ελαττωθεί ο κίνδυνος αυτός είναι η χρήση του handsfree», πρόσθεσε.

Ο σουηδός βιοφυσικός υπογράμμισε ότι η συγκεκριμένη μελέτη είναι η μεγαλύτερη που έχει διεξαχθεί έως σήμερα για την μακροχρόνια χρήση των ασύρματων τηλεφώνων, τα οποία άρχισαν να χρησιμοποιούνται στη Σουηδία το 1984 - αρκετά πριν χρησιμοποιηθεί σε πολλές άλλες χώρες.

Πηγή: Reuters, International Archives of Occupational and Environmental Health online first (March 16, 2006)

Τελευταία Νέα

- ΠΟΥ: Έκτακτη συνάντηση της Επιτροπής Εκτάκτων Καταστάσεων
- Νέα κρούσματα της γρίπης Α σε Αυστρία και Ρουμανία
- Πολλή τηλεόραση, λίγες λέξεις
- Ρουμανία: Δύο νέα κρούσματα της νέας γρίπης Α H1N1
- Απαγόρευση καπνίσματος σε δημόσιες υπηρεσίες

Όροι Χρήσης | Προσωπικά Δεδομένα | Επικοινωνία |
Α.Ν.Α. - Μ.Π.Ε. | Designed by eProductions | Created by
E-Content Systems - Powered by ECS-Portal

Ιατρικός Φάκελος

Οι εκτιμήσεις για τη γρίπη των χοίρων